

核准日期：2007年01月30日
修改日期：2010年03月23日
修改日期：2010年12月06日
修改日期：2014年04月16日
修改日期：2015年12月01日
修改日期：2020年10月29日
修改日期：2021年07月09日
修改日期：2023年04月13日

盐酸昂丹司琼片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：盐酸昂丹司琼片


商品名称：Grazdolan Hydrochloride Tablets

【成份】

本品主要成份为盐酸昂丹司琼。

辅料为乳糖、硬脂酸、

化学名称：2,3-二氧-5-甲基-1H-咪唑并[4,5-c]喹啉-4-羧酸
化学结构式：



分子式： $C_{18}H_{19}N_5O \cdot HCl \cdot 2H_2O$

分子量：365.86

【性状】

本品为白色或类白色片。

【适应症】

止吐药。用于：1.细胞毒性药物化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；2.预防和治

【规格】

4mg（以 $C_{18}H_{19}N_5O$ 计）

【用法用量】

1.对于高度催吐的化疗药引起的呕吐：化疗前15分钟、化疗后4小时、8小时各后每8~12小时口服昂丹司琼片8mg（2片），连用5天。

2.对催吐程度不太强的化疗药引起的呕吐：化疗前15分钟静脉注射昂丹司琼注射液8mg（2片），连用5天。

3.对于放射治疗引起的呕吐：首剂须于放疗前1~2小时口服片剂8mg（2片），的疗程而定。

$C_{18}H_{19}N_5O$

手术后的恶心呕吐。

静脉注射昂丹司琼注射液8mg，停止化疗以

注射液8mg，以后每8~12小时口服昂丹司琼片

以后每8小时口服8mg（2片），疗程视放疗

500小时口服片剂8mg（2片），两次。

转凉、过敏性皮炎或荨麻疹加重，上述反应缓解，无须特

殊的报道。故本品禁止与阿托品联合使用。

本品的能力显著下降，血清半衰期也显著延长，因此，用药物

受昂丹司琼治疗的患者发生尖端扭转型室性心动过速的个别报

可能出现QT间期延长的患者应慎用昂丹司琼，主要包括电解质

【不良反应】

可有头痛、便秘、口干、便秘、偶见支气管哮喘或过

【禁忌】

由于昂丹司琼与盐酸可待因联合用药时有严重低血压和意识丧

【注意事项】

1.对肾脏损害患者，无需调整剂量、用药次数和用药途径。

2.对肝功能损害患者，肝功能中度或严重损害患者体内药物清

量每日不应超过8mg。

3.腹部手术后不宜使用本品，以免掩盖肠鸣或胃扩张症状。

4.昂丹司琼可延长QT间期，并具有剂量依赖性，上市后有接

告。先天性QT间期延长综合征患者应避免使用昂丹司琼。出现晕

