

④ 给药于给药前 1h 口服 2 次，每次 20mg，以后每 8 小时服 8mg，疗程 5 天，停药 5 天。

⑤ 对于严重疼痛，可静脉注射 20mg 地塞米松，可加强本品对高度伴发化疗引起呕吐的疗效。

⑥ 以药量：按体重 5mg/kg 体表面积，每日 2 次，连服 5 天。

⑦ 老年患者：65 岁以上患者的用药疗效及对药物的耐受性与普通

⑧ 对于严重疼痛，可静脉注射 20mg 地塞米松。

⑨ 全身麻醉时，本品可加重苏醒延迟，应谨慎使用。

⑩ 本品以 0.1mg/kg 的剂量或最大剂量 4mg，缓慢静脉注射。

⑪ 本品以 0.1mg/kg 或最大剂量 4mg 的剂量缓慢静脉注射。

⑫ 老年患者：给药剂量、途径及给药间隔参照成人用法。

【不良反应】

可有头痛、嗜睡、恶心、呕吐、便秘、低血压、心动过缓、呼吸抑制、低氧血症、

呼吸抑制加重、注射部位过敏反应、无热热原反应、偶见过敏性休克、癫痫、

文、低血压及心动过缓。

本品在制剂中不含防腐剂，不良反应报告主要如下。这些报告多来自 10 省报告。

不良反应发生率，难以计算发生率。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。

本品不良反应发生率，在 10 省报告如下。这些报告多来自 10 省报告。


... 研究 ... 研究 ... 研究 ...

... 研究 ... 研究 ... 研究 ...

进行观察。

【及妇及哺乳期妇女用药】

... 研究 ... 研究 ... 研究 ...



... 研究 ... 研究 ... 研究 ...

本品是强效、高选择性的 α_1 IT 受体拮抗剂。在临床上用于 1、2 型糖尿病和糖尿病并发症。

本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。

本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。

本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。

本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。

【有效期】36 个月

【执行标准】《中国药典》2020 年版二部

【批准文号】国药准字 H10070180

【药品上市许可持有人】

本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。

【药理作用】

本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。本品在服用后 15 分钟内起效。

【用法用量】

【包装】